

建设城市文明公益广告

文明 每一步 精彩每一景

与道德牵手 / 与和谐同行 / 共建共享城市文明



卫生健康教育宣传栏 (第三十二期)

应对狂犬病, 预防最重要

目前在全球范围内, 狂犬病依然是病死率最高的人兽共患的传染病。鉴于狂犬病病死率几乎 100%, 而规范的暴露后预防几乎 100% 有效, 因此掌握正确的狂犬病预防知识非常重要。

一、除了猫、狗, 还有哪些动物会传播狂犬病?

所有哺乳动物都有感染及传播狂犬病的可能性, 但风险等级不同。老鼠、兔子、牛、猪是狂犬病传播低风险动物; 犬、猫、鼬獾、貉、狼、狐狸、蝙蝠等属于狂犬病传播高风险动物。被狂犬病传播高风险动物致伤后, 一定要尽早去专业的医疗机构进行处置。

二、与动物日常接触比较多, 需要提前预防吗?

救助流浪动物的爱心人士等经常

接触动物者, 以及职业中有狂犬病暴露风险的人员, 如狂犬病毒研究者、接触狂犬病患者的工作人员、兽医等, 建议进行“暴露前免疫”, 也就是提前进行预防性狂犬病疫苗接种, 让身体提前产生免疫屏障。

三、被猫、狗致伤后, 第一时间应该怎么做?

日常生活中, 不幸被狂犬病高风险动物致伤后, 一定要及时前往专业的医疗机构进行规范处置。如果伤口不大, 可以用流动的清水、肥皂水或者其他弱碱性清洁剂清洗伤口大约 15 分钟, 然后就近就医。如果伤口较大、出血较多, 可以使用干净的布进行压迫止血, 并尽快前往医院就诊。

四、狂犬病疫苗什么时候接种合适?

狂犬病疫苗越早接种越好, 接种程序有两种。一种是 5 针免疫程序, 于第 0 (注射当天, 下同)、3、7、14、28 天各注射狂犬病疫苗 1 剂次, 共注射 5 剂次。另一种是“2-1-1”免疫程序, 于第 0 天注射 2 剂次 (左、右上臂三角肌各注射 1 剂次), 第 7、21 天各注射 1 剂次, 共注射 4 剂次。

五、已经打过狂犬病疫苗, 再被高风险动物致伤, 还需要打疫苗吗?

关于“打了疫苗再被咬”的问题, 如果发生在免疫接种过程中, 应继续按照原有免疫程序完成剩余剂次的接种; 如果发生在全程接种后 3 个月内, 一般不需要加强接种; 如果发生在全程接种后 3 个月及以上, 应于第 0、3 天各加强接种 1 剂次狂犬病疫苗。

六、被狗轻轻咬了一下, 但是看

不出伤口, 要打疫苗吗?

与狗亲近玩耍时被轻咬, 但很难用肉眼来准确判断有没有伤口时, 可以用医用酒精涂抹在疑似受伤部位, 如果没有疼痛的感觉, 说明皮肤没有破损, 只要认真清洗即可。如果感觉到疼, 说明有轻微、无明显出血的伤口, 可以判定为狂犬病 II 级暴露, 需要到医院正确处置伤口并接种疫苗。

七、孕妇可以接种狂犬病疫苗吗? 接种狂犬病疫苗后可以哺乳吗?

目前研究显示, 孕妇接种狂犬病疫苗是安全的, 不会对胎儿造成不良影响。哺乳期妇女接种狂犬病疫苗后可以正常哺乳。 (来源: 健康中国)

格尔木市卫生健康委员会 宣